



Консультація для батьків



Перша медична допомога

дитині при укусах комах



Загальна, системна алергічна реакція: місцева реакція, сильний свербіж, висип по всьому тілу, набряк шкіри та слизових оболонок, утруднене дихання.

Перша допомога:

- ❖ прикласти холод на місце укусу, не менш ніж на 10 хв;
- ❖ якщо вкушена кінцівка: зробити туге бинтування на 5 см вище місця укусу, потрібно контуролювати накладену пов'язку і потрібно ослабити, якщо виникає набряк кінцівки.
- ❖ якщо укус був на голові чи шиї – придавіть місця укусу
- ❖ дати антигістамінний препарат загальної дії відповідно віку;
- ❖ використати гормональний препарат або звертатися за медичною допомогою

Якщо дорослого чи дитину комаха вкусила вперше, то ризик системної алергії – мінімальний, можлива місцева реакція у місці укусу. Однак вірогідність реакції зростає з кожним наступним укусом. Якщо після вжалення, наприклад, бджолою виникла тяжка алергічна реакція, варто бути дуже обережним, бо наступний укус може бути більш небезпечний.



Відпочивати на природі та не стикнутися з комахами майже неможливо. І для дорослих, і для малих укуси комах викликають не тільки дискомфорт, а й можуть значно погіршувати самопочуття та викликати важкі алергічні реакції. Отож, що робити, якщо дитину або Вас вкусила комаха?

Види алергічних реакцій на укуси комах та перша допомога

До 5% людей мають схильність до загальних реакцій на укуси комах. Організм людини може бути дуже чутливим до ядів комах, і в таких людей можуть виникати алергічні реакції, які можуть впливати на весь організм – **систематичні** (вони найнебезпечніші для здоров'я) або **локальні** – проявлятися лише у місці укусу. **Місцеві симптоми:** свербіж, припухлість та почервоніння шкіри, діаметр почервоніння більше 10 см і більше.

Перша допомога:

- ❖ прикласти холод на місце укусу, не менш ніж на 10 хв;
- ❖ нанести протиалергічну мазь (Феністил гель, Псилобальзам, гідрокортизонова мазь 1%);
- ❖ дати антигістамінний препарат загальної дії відповідно віку;
- ❖ якщо після нанесення мазі немає ніякого ефекту, доцільно використати гормональний протизапальний засіб.

